



Operation bygkorn

Operationen har til formål at fjerne bygkorn.

Operationen

Hvis du ønsker det, kan du få en afslappende tablet inden operationen.

Operationen foregår ambulantly i lokalbedøvelse og er derfor smertefri. Selve lokalbedøvelsen kan naturligvis svide ved indsprøjtningen, men det er hurtigt overstået, og bedøvelsen virker hurtigt.

Ved operationen vendes øjenlåget, og bygkorn fjernes fra slimhindsiden for at undgå ardannelse.

Efter operationen får du Kloramfenikol salve i øjet, og der anlægges en klapp.

Klappen kan du tage af efter en halv time.

Du kan tage hjem umiddelbart efter operationen.

Efter operationen

Det kan af og til sive lidt fra såret. Fold da et rent klæde og pres det let mod såret 20 min.

Undgå at gnide i såret.

Du skal bruge Kloramfenikol salve 3 gange daglig i 4 dage efter operationen.

Kontaktlinser bør ikke anvendes den næste uge.

Du må gerne gå i brusebad.

Senfølger

Hævelse og misfarvning af øjenomgivelserne kan forekomme og forsvinder igen efter 1-2 uger.

Bygkornet kan komme igen samme sted, eller der kan komme bygkorn andre steder.

Nogle gange er det nødvendigt at gentage indgrebet, fordi bygkornet er kommet igen.