
Laserbehandling af åbenvinklet grøn stær – SLT-behandling



Grøn stær (glaukom) er en kronisk øjenlidelse, som oftest indebærer et forhøjet øjentryk. Der kan også være defekter på synsfeltet og tegn på skader af synsnerven. Det forhøjede øjentryk kan på længere sigt medføre blivende skader i synsfunktionen.
Grøn stær er en lumsk sygdom, fordi patienten ingen symptomer har.

Behandlingsmulighederne begrænser sig til at nedsætte øjentrykket også selvom det ikke var væsentligt forhøjet fra start

Medicinsk behandling:

Behandlingen af grøn stær begynder ofte med tryksænkende øjendråber, der findes flere typer på markedet og behandlingen skræddersyes den enkelte.

Laserbehandling:

Hos nogle patienter kan det være hensigtsmæssigt at starte den tryksænkende behandling med laserbehandling (SLT) hos nogle kan denne behandling sænke øjentrykket nok hos andre er det nødvendigt at supplere med dråbebehandling.

SLT-behandlingen består af belysning med YAG-laser lys i øjets kammervinkel.
Behandlingen sænker øjentrykket med ca. 20% hos 80% af patienterne. Det er samme effekt man får at behandle med en dråbe daglig.

Hvis du skal have SLT- behandling, får du øjendråber, der trækker pupillen sammen (pilokarpin). Pilokarpindråberne kan godt give kortvarig hovedpine. Vi tilbyder hovedpinepiller, hvis er nødvendigt.

Når pupillen er blevet lille, kan lægen give dig lysbehandlingen. Først får du bedøvende dråber fordi lægen er nødt til at sætte en kontaktlinse på øjet under behandlingen.

Behandlingen er normalt smertefri. Du føler måske nogle små prik i øjet, men der er ikke nogen egentlig smerte.

Behandlingen tager ca. 10 minutter. Efter behandlingen skal du vente i klinikken i 30 min. hvorefter vi måler øjentrykket.

Det er ***vigtigt*** at du tager dine almindelige tryknedsættende øjendråber både før og efter SLT- behandlingen.

Hvis du oplever, at øjet bliver rødt, der kommer smerter og lysfølsomhed, skal du dryppe med Maxidex 3 gange dagligt i 5 dage. Recepten er på apoteket.

Effekten af behandlingen kan først måles 2 måneder efter behandlingen, derfor er det vigtigt at du bliver ved at dryppe som vanligt.